

Braunol®

a bőr és nyálkahártya fertőtlenítőszer

Jó(d) a sebre!



Antiszeptikus hatású bőr- és nyálkahártya fertőtlenítőszer

- Széles antimikrobiális hatásspektrum (baktericid, fungicid, tuberkulocid, protocid, vírucid a lipophyl, HBV és HIV vírusokra)

Alkalmazása:

- Aszeptikus sebkezelés, gulladt sebek kezelése
- Bakteriális és gombás bőrfertőzéseknél
- Injekciózás, vérvétel, infúziók előtt a bőrfelület fertőtlenítésére és a nyálkahártya csírátlánítására
- Műtetre kerülő betegek személyi fertőtlenítésre (fertőtlenítő fürdetés)

Braunol®

Tulajdonságok

- A Braunol® standardizált PVP-Jód oldat, amely 10% szabad aktív jódot tartalmaz, amely biztosítja a széles antimikrobiális hatásspektrumot
- A PVP- Jód tulajdonságainak köszönhetően spóráölő hatással is rendelkezik
- 1-2 perc alatt fejt ki teljes hatását a baktériumokkal és gombákkal szemben és olyan kórokozókkal szemben, mint a Staphylococcus aureus és a Escherichia coli
- Megfelel az OTH előírásainak bőr-és nyálkahártya fertőtlenítőszerként (OTH engedélyszám: 3916-2/2002) és a DGHM (Német Higiéniiai és Mikrobiológiai Társaság) előírásainak sebészeti kéz és bőrfertőtlenítés területére is
- Jó bőrbarát tulajdonságokkal rendelkezik, sérült hám esetén is fájdalommentes dezinfekciót biztosít



Mikrobiológiai hatékonyság

- baktericid (MRSA), fungicid, tuberkulocid, protocid és vírusinaktiváló hatású a lipophyl és a HBV és HIV vírusokra.

A Braunol® hígítatlanul vagy vizes hígítású oldatban alkalmazható felhasználási területtől függően. Mossa le az érintett bőrfelületet, amíg az egész felület nedves nem lesz, majd hagyja rászáradni 1-2 percig.

Felhasználási területei:

Hígítatlan formában (töményen):

- injekciózás, vérvétel, biopsziák, punkciók előtt, valamint a műtéti bőrfelület fertőtlenítésére ép bőrfelületen alkalmazva
- kezek sebészi fertőtlenítésére (5 ml Braunol®-al dörzsölje be a kezét, majd mossa le vízzel)

1:3–1:6 hígításban:

- Szembe (BSS-puffer oldattal hígítva)

1:10 hígításban:

- aszeptikus sebkezelésnél, égett bőrfelület kezelésére, nyálkahártya fertőtlenítésre, bakteriális és gombás bőrfertőtlenítésnél

1:100 hígításban:

- betegfertőtlenítő fürdetésnél műtét előtt. Ajánlott a teljes testfelületet bekenni a hígított oldattal, majd 1-2 perces behatási idő után langyos vízzel leöblíteni

A vizes oldatot mindig a használat előtt, frissen kell elkészíteni és a hígított oldatot nem szabad tárolni.

Ellenjavallatok:

Jódérzékenység, pajzsmirigy adenoma, pajzsmirigyműködés egyéb zavarai, jód-izotópos diagnosztika, veseelégtelenség, hipertyreosis, pajzsmirigy terapeutikumok alkalmazásakor, radioterápia. Koraszülöttek, újszülöttek és csecsemők kezelése, valamint a terhesség 3. hónapjától és a szoptatás alatt, csak orvosi ellenőrzés mellett egyéni mérlegelés alapján történhet!

- A Braunol® nem alkalmazható együtt enzimatikus sebkénőcsökkel, higany-tartalmú fertőtlenítőkkel.
- Eltarthatóság: bontatlan, ép csomagolásban, fénytől védve, száraz, hűvös helyen előírt tárolási feltételek mellett 5 év.
- Csomagolás: 30 ml, 100 ml műanyag palack, 250 ml-es szórófejes palack, 1000 ml-es műanyag palack csavaros zárókupakkal.

A Braunol® tartós elszíneződést nem okoz, a textíliákból langyos szappanos vízzel kimosható, erősebb szennyeződés esetén szalmiákszesszel vagy Na-tioszulfát oldattal (fixírsó) eltávolítható.



B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

B. Braun Medical Kft.
1023 Budapest
Felhévízi u. 5.

Tel.: +36 (1) 346-9700
Fax: +36 (1) 438-4900

www.bbraun.hu

